

HOGYAN VIGYÁZZAK A BEÜLTETETT SZERVEMRE?

Gyógyszerszedés és kontrollvizsgálatok



IMMUNSZUPPRESSZÍV SZEREK



Immunszuppresszív gyógyszerekre azért van szükség, hogy azok gyengítsék az „idegen” szerv elleni immunválaszt, és megakadályozzák, hogy a szervezet kilökje az új szervet.



Ha bármilyen szokatlan hatást tapasztal gyógyszerzedéskor, értesítse kezelőorvosát!



Egyes kilökődésgátló gyógyszereket egész életében szednie kell, a gyógyszerek adagolását kezelőorvosja állítja be.



Kezelőorvos engedélye nélkül nem szabad kihagynia egy adagot sem, és nem csökkentheti a szedett gyógyszer mennyiségét, különben elveszítheti a beültetett szervet, sőt az életét is veszélyeztetheti.



Gyógyszereinek bevitelét kösse valamilyen napi rutintevékenységhez és igyekezzen mindig ugyanabban az időben bevenni őket!

GYÓGYSZERSZINT-MONITOROZÁS

Az immunszuppresszív kezelések célja, hogy a gyógyszerek koncentrációját mindig optimális szinten tartásuk a szervezetben, és így megakadályozzák az új szerv kilökődését, de ne gyengítsék le túlzottan az immunrendszert.

Miért? – Az optimális gyógyszer szintet az egyéni tulajdonságok figyelembevételével – személyre szabottan – kell beállítani. Ezt a kilökődésgátló gyógyszerek koncentrációjának gyakori mérésével lehet ellenőrizni.

Mikor? – A vérvételt a napi gyógyszerbevitel fix időpontja elé kell időzíteni. (Például: ha mindennap 9-kor veszi be gyógyszerét, akkor 8-ra menjen laborvizsgálatra.)



KILÖKÖDÉS JELEI

Bár a kilökődés még nem jelenti szükségszerűen a beültetett szerv elvesztését. A gyógyszerek és a gyógyszerek dózisának emelésével vagy új szerek átmeneti alkalmazásával a folyamat sokszor megállítható, sőt vissza is fordítható. **De a kilökődés jeleire oda kell figyelni és komolyan kell venni!**

A kilökődésre utaló első jelek nem mindig egyértelműek, kiemelten figyeljen a tünetekre.


Fontos!
Ha időben felismerik, a legtöbb kilökődési folyamat sikeresen visszafordítható.



KONTROLLVIZSGÁLATOK


A transzplantációt követő első 3 hónapban általában hetente, később ritkábban, de **rendszeres időközönként** követéses vizitekre kell járnia a transzplantációs ambulanciára. **Mindig vegyen részt a kontrollvizsgálatokon**, mert kezelőorvosai így tudják nyomon követni állapota változását, az esetleges szövődeményeket pedig még a korai szakaszban felismerik.

A kontrollvizsgálatok célja eltérő lehet




Általános ellenőrzés

Bizonyos kilökődésgátló szerek mellékhatásaként megnő a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek, pl. a magas vérnyomás kialakulásának veszélye.



Gyógyszerszint-monitorozás

A levett vérben megméri bizonyos kilökődésgátló gyógyszereinek maradékszintjét. Szükség esetén kezelőorvos módosítja gyógyszerbevitelét.



Szűrővizsgálatok

A szervezet természetes védekezőrendszerének visszaszorítása miatt a daganatos betegségek kialakulásának lehetősége is magasabb, ezért szükséges rendszeres szűrővizsgálatra (pl. bőrgyógyászat, fogászat) járnia.



Azonosító: TX_2022_0005_HBR
Lezárás dátuma: 2022. 09. 01.
Astellas Pharma Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: (1) 577 8200 Fax: (1) 577 8210

Az információk csupán tájékoztató jellegűek, és semmiképp sem hivatottak helyettesíteni az orvos vagy bármilyen más egészségügyi szakember által adott utasításokat, információkat, tanácsokat. Bővebb információért forduljon kezelőorvosához!